

NOTA OPERATORIA:

Caracas

Se practica **CESAREA** a la Sra: _____

Indicación: _____

Con características: Emergencia __ Electiva__
Riesgo: Bajo__ Alto__

Inicio: _____

Fin: _____

Bajo anestesia neuraxial se practica Cesárea Segmentaria vía incisión de Joel Cohen, tecnica de Misgav-Ladach previa antisepsia local y colocación de campos estériles. Histerotomía transversa segmentaria por divulsión sin flap vesical se obtiene Recién Nacido vivo de sexo Masculino __ Femenino __ que __ lloró al nacer y fue atendido por pediatra neonatólogo

Hora: _____ Peso: _____ Talla: _____

Alumbramiento por maniobras externas, curaje de cavidad uterina y colocación de Oxitocina intramural 10 Uds. Se deja cavidad limpia e indemne en condiciones para ser reparada. Histerorrafia en 2 planos. Se indica la colocación de antibióticos profilácticos a la madre y útero-tónicos parenterales.

Hemostasia final, limpieza de cavidad, revisión de anatomía de la cavidad pélvica, trompas de Falopio y ovarios, con los siguientes hallazgos y/o procedimientos realizados como consecuencia de los hallazgos o indicación *in situ*:

Síntesis por planos a partir de músculos abdominales. Sutura cutánea subcuticular bajo estándares estéticos. Cura final

Dr. Ricardo Gómez Betancourt
Ayudante:
Anestesiologo: